

AVERTISSEMENTS PRATIQUES

REGION LORRAINE

AGRICOLES

Bulletin technique nº 15 du 19 juin 2000

Maïs **Pyrale**

Le vol a débuté le 16 juin dans notre cage d'élevage de Crantenoy. Comme en 1999, ce début de vol est très précoce. Il présage des périodes de traitement également précoces.

Trichogrammes: A placer dès que possible dès la mise à disposition des capsules (ne pas les stocker).

Traitements chimiques: Dans les secteurs les plus chauds, le traitement devra sans doute intervenir durant les derniers jours de juin et les premiers jours de juillet et entre le 3 et le 8 juillet dans les autres secteurs. Rappelons que les traitements à base de pyréthrinoïde liquide sont susceptibles de favoriser le développement de pucerons.

Se reporter au bulletin n° 14 du 8 juin pour les secteurs les plus exposés au risque pyrale.

1340 Jo 50614

Colza

Le risque Alternaria est maintenant terminé. Quelques parcelles ont été très fortement attaquées par le Sclerotinia malgré les traitements effectués.

En collaboration avec le CETIOM et les Chambres d'Agriculture, un programme d'analyses est prévu, afin de vérifier si ces manques d'efficacité sont liés à des problèmes de résistance.

₩ 03.83.30.41.51 Fax: 03.83.32.00.45

Le Directeur-Gérant : D. VERBEKE

Publication périodique C.EP.A.P. nº 2011 AD ISSN n° 0980-8507

SPV Toute

Service Régional de la Protection des Végétaux 38 rue Sainte Catherine 54643 NANCY CEDEX

Imprimé à la Station d'Evertissements Agricoles de Lorraine

Abonnement annuel: 400 F

P 192

Pyrale du

maïs:

précoces.

Traitements